

Klinik durum: Künt Abdominal Travma

Varyasyon 1: Stabil olmayan hasta.

Radyolojik Prosedür	Puan	Yorum	RRD*
Direk göğüs grafisi	8	Hastanın durumu izin verirse, kırığı, pnömomediastinum ve abdominal hava ya da gaz birikmelerini değerlendirmek için. Göğüs radyografisi, BÜM(böbrek-üreter-mesane abdominal radyografi) ve FAST tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır.	☢
Göğüs karın ve pelvisin ultrason incelemesi (FAST)	8	Hastanın durumu izin verirse serbest sıvı için hızlı değerlendirme. Göğüs radyografisi, DÜS (direk üriner sistem grafisi) ve FAST tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır.	○
Abdomen ve pelvis direk grafisi (DÜG)	8	Kırık, intraperitoneal serbest hava ya da anormal sıvı ve gaz birikmelerini değerlendirmek için. Göğüs radyografisi, DÜS (direk üriner sistem grafisi) ve FAST tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır.	☢☢
Abdomen ve pelvis olası embolizasyonu birlikte arteriyografi	5	Başlangıç görüntüleme yöntemi olarak uygun değil ama ek klinik bilgi ya da görüntüleme çalışmaları aktif kanama olasılığını gösteriyorsa daha uygun hale gelebilir.	Değişken
Kontrastsız abdomen ve pelvis BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. Hastanın durumu düzeldiğinde ve hemodinamik olarak stabil olduğunda uygunluk derecelendirmesi artabilir. Sadece daha önceden ağır kontrast reaksiyonu olan ya da böbrek yetmezliği bulunanlarda düşünülür.	☢☢☢☢
Kontrastlı abdomen ve pelvis BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. Hastanın durumu düzeldiğinde ve hemodinamik olarak stabil olduğunda uygunluk derecelendirmesi artabilir.	☢☢☢☢
Kontrastlı ve kontrastsız abdomen ve pelvis BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil.	☢☢☢☢
Kontrastsız göğüs BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. Hastanın durumu düzeldiğinde ve hemodinamik olarak stabil olduğunda uygunluk derecelendirmesi artabilir. İnfüzyon olmadan görüntüleme sadece daha önceden ağır kontrast reaksiyonu olan ya da böbrek yetmezliği bulunanlarda düşünülür.	☢☢☢
Kontrastlı göğüs BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. Hastanın durumu düzeldiğinde ve hemodinamik olarak stabil olduğunda uygunluk derecelendirmesi artabilir.	☢☢☢

Kontrastlı ve kontrastsız göğüs BT	3	Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. Hastanın durumu düzeldiğinde ve hemodinamik olarak stabil olduğunda uygunluk derecelendirmesi artabilir.	☢☢☢
Abdomen ve pelvis ultrason	2		O
<u>Puan skalası:</u> 1,2,3: Genellikle uygun değil. 4,5,6: Uygun olabilir. 7,8,9: Genellikle uygun			*Relatif radyasyon düzeyi