

Aritmi olan kadınlarda doğum anında önerilen izlem seviyeleri				
Doğumda hemodinamik bozulma ile aritmi riski		İzlem seviyesi	Sınıf	Seviye
Düşük risk	PSVT, AF, idiyopatik VT, düşük riskli LQTS, WPW sendromu	1	I	C
Orta risk	Unstabil SVT, VT, implante ICD, VT ve yapısal kalp hastalığı olanlar, Brugada sendromu; orta risk: LQTS, katekolaminerjik polimorfik VT	2	I	C
Yüksek risk Hayatı tehdit eden aritmi	Yapısal kalp hastalığı / konjenital kalp hastalığında unstabil VT, yüksek riskli LQTS hastalarında unstabil VT / TdP, kısa QT sendromu, yüksek riskli katekolaminerjik polimorfik VT	3	I	C
Eylem planı		İzlem seviyesi		
		Düşük 1	Orta 2	Yüksek 3
Kardiyoloji konsültasyonu		x		
Uzman merkezde aritmi uzmanları da dahil olmak üzere multidisipliner ekiple konsültasyon			x	x
Doğum uzmanları tarafından tavsiye edilen doğum şekli ve yeri		x	x	
Sezaryen ile doğum yapılması önerilir				x
Kardiyak ritmi izleme (telemetri, ritim monitörü)			(x)	x
İntravenöz yol			x	x
Arteriyal yol				x
Adenosin intravenöz uygulama için hazırlanır			x	
Beta-blokerin intravenöz uygulama için hazırlanır			x	x
Seçilen antiaritmik ilaçların intravenöz uygulanması için hazırlanır				x
Hasta başında eksternal defibrilatör			x	x
Kalp damar ameliyathanesinde doğum				x
Gerekirse kardiyoloji yoğun bakım ünitesine doğum sonrası transfer için hazırlanır				x
AF = atriyal fibrilasyon; ICD = implant kardiyoverter-defibrilatör; LQTS = uzun QT sendromu; PSVT = paroksizmal supraventriküler taşikardi; SVT = supraventriküler taşikardi; TdP = torsade de pointes; VT = ventriküler taşikardi; WPW = Wolfe-Parkinson-White.				